

SVÄLJES HELA[®]

En förteckning med kommentarer över tablett/kapslar
som måste eller bör sväljas hela

Observera kommentarerna längst bak. Där framgår det om t.ex. en tablett som bör sväljas hel, bara kan delas eller kan delas, tuggas och krossas.

Uppdaterad: Mars 2013

Viktig information om "SVÄLJES HELA"

Vad är "Sväljes hela"?

Förteckningen är framtagen av Apoteket AB och är en sammanställning av uppgifter från läkemedelsföretagen. Uppgifterna hämtas från, av Läkemedelsverket godkänd, produktresumé och bipacksedel och kompletteras vid behov med information direkt från företagen när så är möjligt.

Nya läkemedel fram till och med mars 2013 är inlagda i förteckningen och viss övrig uppdatering har skett. Enstaka uppgifter kan ha hunnit ändras beroende på när revidering skett. Misstag kan heller inte uteslutas, till exempel att något läkemedel saknas i förteckningen eller att någon kod/text inte är korrekt.

Vem kan använda "Sväljes hela"?

Förteckningen är en service till legitimerad personal inom vården som har behörighet att ordinera och/eller administrera läkemedel till vårdtagare.

Hur kan "Sväljes hela" användas?

Förteckningen är avsedd som ett hjälpmedel i vardagligt arbete och användandet sker på eget ansvar. Vid tveksamhet eller i speciellt känsliga fall bör uppgifterna verifieras genom kontakt med läkemedelsföretaget.

Dokumentet kan skrivas ut eller kopieras för personligt icke-kommersiellt bruk.

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Abboticin Novum	tablett		56:09	Bör sväljas hela
Absenor	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Absenor	tablett	300 mg	56:42	Bör sväljas hela
Absenor Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Acetylsalicylsyra Actavis	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Acetylsalicylsyra APL	kapsel		56:05	Bör sväljas hela
Adalat	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Adalat Oros	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Adartrel	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Adrovanse	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Advagraf	depotkapsel, hård		55:34	Måste sväljas hela
Afinitor	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Agiolax	granulat		56:86	Bör sväljas hela
Alenat	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Alenat Veckotablett	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Alendronat Arrow, STADA, Teva	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Alendronat Veckotablett Accord, Actavis, Bluefish, Mylan, Orifarm, Ranbaxy, ratiopharm, Sandoz, Teva	tablett (veckotablett)		55:42	Måste sväljas hela
Alfacalcidol Alternova, Orifarm	kapsel, mjuk		56:13	Bör sväljas hela
Alfadil	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Alfadil BPH	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Alfuzosin Actavis, Hexal, Ranbaxy, STADA, Teva, Winthrop	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Alimemazin APL	kapsel		56:05	Bör sväljas hela
Alkeran	filmdragerad tablett		55:61	Måste sväljas hela
alli	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Almogran	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Alprazolam Krka	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Alvedon 665 mg	tablett med modifierad frisättning		55:55	Måste sväljas hela
Alzen Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Amaryl	tablett		56:67	Bör sväljas hela
Ameu Elge	kapsel		56:96	Bör sväljas hela
Aminess N	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Amlarrow	tablett		56:08	Bör sväljas hela
Amoxicillin Aurobindo, Mylan	kapsel, hård		56:58	Bör sväljas hela
Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Anafranil	dragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Anafranil Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Angemin	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Ansapipin	kapsel		56:72	Bör sväljas hela
Aotal	enterotablett		55:08	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Aptivus	kapsel, mjuk		56:90	Bör sväljas hela
Arava	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Ariclaim	enterokapsel, hård		55:52	Måste sväljas hela
Arimidex	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Arketis	tablett		56:67	Bör sväljas hela
Arlevert	tablett		55:72	Måste sväljas hela
Arthrotec	tablett med modifierad frisättning		55:20	Måste sväljas hela
Arthrotec forte	tablett med modifierad frisättning		55:20	Måste sväljas hela
Asacol	enterotablett		55:47	Måste sväljas hela
Asasantin Retard	depotkapsel, hård		56:07	Bör sväljas hela
Atorab	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Atorbir	filmdragerad tablett		56:67	Bör sväljas hela
Atorstad	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Atorvastatin Actavis, Paranova, Pfizer, Ranbaxy, Sandoz, Teva	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Atorvastatin Krka, Orifarm	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Atripla	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Avelox	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Avodart	kapsel, mjuk		55:02	Måste sväljas hela
Azathioprin Actavis, Orifarm	filmdragerad tablett		56:32	Bör sväljas hela
Azatioprin Mylan	tablett		56:32	Bör sväljas hela
Azithromycin Jubilant, Mylan, Orifarm	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Azithromycin STADA	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Belladonna-ergotamin	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Betmiga	depottablett		55:02	Måste sväljas hela
Bezalip	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Bezalip Retard	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Bicalustad	filmdragerad tablett		56:98	Bör sväljas hela
Bicalutamid Sandoz	filmdragerad tablett		55:01	Måste sväljas hela
Bicalutamide Bluefish	filmdragerad tablett		56:92	Bör sväljas hela
Bicalutamide Orion, Teva	filmdragerad tablett		56:98	Bör sväljas hela
Bictamid	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Bikalutamid Actavis, medac, Ranbaxy	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Bikalutamid SUN	filmdragerad tablett		55:01	Måste sväljas hela
Biltricide	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Bisocard	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Bisomyl	filmdragerad tablett	1,25 mg	55:31	Måste sväljas hela
Bisomyl	filmdragerad tablett	2,5 mg	56:00	Bör sväljas hela
Bisoprolol Mylan	filmdragerad tablett		56:00	Bör sväljas hela
Bisoprolol Orifarm	tablett		56:00	Bör sväljas hela
Bisoprolol Orion	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Bisoprolol Sandoz	filmdragerad tablett	1,25 mg	55:31	Måste sväljas hela
Bisoprolol Sandoz, STADA	filmdragerad tablett	2,5 mg 3,75 mg 5 mg	56:12	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
		7,5 mg 10 mg		
Bisoprolol Teva	tablett	1,25 mg	55:31	Måste sväljas hela
Bisoprolol Teva	tablett	2,5 mg	56:67	Bör sväljas hela
Bisoprolol Vitabalans	tablett		56:67	Bör sväljas hela
Bisostad	tablett	1,25 mg	55:31	Måste sväljas hela
Bisostad	tablett	2,5 mg	56:67	Bör sväljas hela
Bondronat	filmdragerad tablett		55:42	Måste sväljas hela
Bonefos	filmdragerad tablett	800 mg	56:27	Bör sväljas hela
Bonviva	filmdragerad tablett		55:42	Måste sväljas hela
Bricanyl Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Brufen	filmdragerad tablett		56:16	Bör sväljas hela
Brufen Retard	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Budenofalk	enterokapsel, hård		55:06	Måste sväljas hela
Budesonid Orifarm	depotkapsel, hård		56:71	Bör sväljas hela
Bupropion Paranova	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Campral	enterotablett		55:08	Måste sväljas hela
Caprelsa	filmdragerad tablett		56:91	Bör sväljas hela
Cardizem	tablett		56:08	Bör sväljas hela
Cardizem Retard	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Cardizem Unotard	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Cardura	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Carlson Vitamin A	kapsel		56:01	Bör sväljas hela
Carotaben	kapsel		56:47	Bör sväljas hela
Casodex	filmdragerad tablett		56:98	Bör sväljas hela
Cedax	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Cefadroxil Mylan, Sandoz	kapsel, hård		56:74	Bör sväljas hela
Celebra	kapsel, hård		56:22	Bör sväljas hela
Celebrex	kapsel, hård		56:22	Bör sväljas hela
CellCept	kapsel, hård	250 mg	55:56	Måste sväljas hela
CellCept	tablett	500 mg	55:21	Måste sväljas hela
Centyl K	filmdragerad tablett		55:39	Måste sväljas hela
Centyl K Mite	filmdragerad tablett		55:39	Måste sväljas hela
Certican	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Cetirizin, HEXAL, Mylan, Sandoz, STADA	filmdragerad tablett		56:12	Bör sväljas hela
Champix	filmdragerad tablett		56:61	Bör sväljas hela
Ciklosporin IVAX	kapsel, mjuk		55:03	Måste sväljas hela
Ciprofloxacin Accord, Actavis, Arrow, Bluefish, BMM Pharma, Krka, Mylan	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Ciprofloxacin Hexal, Ranbaxy	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Circadin	depottablett		55:02	Måste sväljas hela
Citalopram Arrow	filmdragerad tablett		56:93	Bör sväljas hela
Clindamycin Alternova, Orifarm	kapsel, hård		55:07	Måste sväljas hela
Colazid	kapsel, hård		56:34	Bör sväljas hela
Colpermin	kapsel		55:19	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Combizym	tablett		55:03	Måste sväljas hela
Concerta	depottablett		55:24	Måste sväljas hela
Copegus	filmdragerad tablett		55:23	Måste sväljas hela
Coramil	depotkapsel, hård		55:34	Måste sväljas hela
Creon 10000	enterokapsel, hård		56:63	Bör sväljas hela
Creon 25000	enterokapsel, hård		56:63	Bör sväljas hela
Creon 40000	enterokapsel, hård		56:63	Bör sväljas hela
Crestor	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Crixivan	kapsel, hård		56:54	Bör sväljas hela
Cycloserine	kapsel		56:01	Bör sväljas hela
Cymbalta	enterokapsel, hård		56:47	Bör sväljas hela
Cystagon	kapsel, hård		56:89	Bör sväljas hela
Dalacin	kapsel, hård		55:07	Måste sväljas hela
Danafusin	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Davedax	tablett		56:67	Bör sväljas hela
Depakine Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Depolan	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Desogestrel Teva	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Detrusitol SR	depotkapsel, hård		56:46	Bör sväljas hela
Diacomit	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
Diclofenac BMM Pharma	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Diclofenac T ratiopharm	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Difclir	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Diflucan	kapsel, hård		56:47	Bör sväljas hela
Diklofenak Mylan, Orifarm, Sandoz	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Diklofenak T Actavis, Evolan, Orifarm	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Dimetikon Meda	kapsel, mjuk		56:13	Bör sväljas hela
Dimor	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Dipentum	kapsel, hård		56:69	Bör sväljas hela
Disofrol	depottablett		55:24	Måste sväljas hela
Ditropan	tablett		56:42	Bör sväljas hela
Dolcontin	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Dolcontin Unotard	depotkapsel, hård		56:46	Bör sväljas hela
Doxazosin Actavis, ratiopharm, STADA	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Doxycyklin 2care4, Orifarm	tablett		56:30	Bör sväljas hela
Doxyferm	tablett		56:30	Bör sväljas hela
Dulcolax	enterotablett		55:47	Måste sväljas hela
Durbis	kapsel, hård		56:22	Bör sväljas hela
Durbis Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Duroferon	depottabletter		55:43	Måste sväljas hela
Edronax	tablett		56:67	Bör sväljas hela
Eeze	filmdragerad tablett		56:26	Bör sväljas hela
Eezeneo	filmdragerad tablett		56:26	Bör sväljas hela
Efedrin APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Efexor Depot	depotkapsel, hård		55:04	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Efient	filmdragerad tablett		56:76	Bör sväljas hela
Egazil	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
ELIQUIS	filmdragerad tablett		56:77	Bör sväljas hela
Emconcor	filmdragerad tablett		56:12	Bör sväljas hela
Emconcor CHF	filmdragerad tablett	1,25 mg	55:31	Måste sväljas hela
Emconcor CHF	filmdragerad tablett	2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg	56:12	Bör sväljas hela
Emend	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Emselex	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Emtriva	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Enalapril APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Entocir	depotkapsel, hård		56:71	Bör sväljas hela
Entocord	depotkapsel, hård		56:71	Bör sväljas hela
Entocort	depotkapsel, hård		56:71	Bör sväljas hela
Eox	filmdragerad tablett		56:26	Bör sväljas hela
Epanutin	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Equasym Depot	kapsel med modifierad frisättning, hård		56:59	Bör sväljas hela
Ergenyl	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Ergenyl Retard	depotgranulat, dospåse		55:11	Måste sväljas hela
Ergenyl Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Ery-Max	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Esbriet	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
Esomeprazol Krka, ratiopharm	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Esomeprazol Pensa	enterotablett		56:18	Bör sväljas hela
Esomeprazole Ranbaxy	enterotablett		56:18	Bör sväljas hela
Estracyt	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Etalpa	kapsel, mjuk		56:13	Bör sväljas hela
Euphylong	depotkapsel		56:29	Bör sväljas hela
E-vimin	kapsel, mjuk		56:53	Bör sväljas hela
Eviplera	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Exelon	kapsel, hård		56:79	Bör sväljas hela
Exlutena	tablett		56:09	Bör sväljas hela
Famotidin Hexal	filmdragerad tablett		56:49	Bör sväljas hela
Fampyra	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Famvir	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Felodipin Actavis, AstraZeneca, Hexal, Mylan, ratiopharm, Sandoz, STADA, Teva	depottablett		55:27	Måste sväljas hela
Femar	filmdragerad tablett		56:98	Bör sväljas hela
Fevarin	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Finasterid Actavis, Arrow, Aurobindo, Orion, Sandoz, STADA	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Finasteride Accord, Ranbaxy	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Fluconazol Actavis, BMM Pharma, Hexal,	kapsel, hård		56:65	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Medartuum, Mylan, Nycomed				
Fluconazol Aurobindo	kapsel, hård		55:77	Måste sväljas hela
Fluconazol Krka	kapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela
Fludara	filmdragerad tablett		55:61	Måste sväljas hela
Flukloxacillin Evolan	kapsel, hård		56:58	Bör sväljas hela
Flukonazol Medartuum, Mylan	kapsel, hård		56:65	Bör sväljas hela
Fluoxetin Mylan, ratiopharm, Sandoz, Teva	kapsel, hård		56:58	Bör sväljas hela
Fluoxetine Accord	kapsel, hård		56:58	Bör sväljas hela
Folsyra APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Fosamax	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Fosamax Veckotablett	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Fosavance	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Fosfat APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Fulcro	kapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela
Fumaderm	tablett		55:29	Måste sväljas hela
Furix Retard	depotkapsel, hård		56:29	Bör sväljas hela
Fycompa	filmdragerad tablett		55:76	Måste sväljas hela
Gabapentin Actavis, Nycomed	kapsel, hård		56:72	Bör sväljas hela
Gabapentin Ranbaxy	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Gabapentin Sandoz	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Gabapentin Sandoz	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
Gabapentin Teva	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Gabapentin Teva	kapsel, hård		56:72	Bör sväljas hela
Galantamin Krka	depotkapsel, hård		56:29	Bör sväljas hela
Galantamin Teva	depotkapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela
Galvus	tablett		56:09	Bör sväljas hela
Gemadol	depotkapsel, hård		56:29	Bör sväljas hela
Gestrina	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Glimepirid Actavis, BMM Pharma, Sandoz, STADA	tablett		56:67	Bör sväljas hela
Glivec	filmdragerad tablett		56:52	Bör sväljas hela
Glucophage	filmdragerad tablett		56:92	Bör sväljas hela
Glukosamin Pharma Nord	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Granisetron STADA	filmdragerad tablett		56:76	Bör sväljas hela
Heminevrin	kapsel, mjuk		55:03	Måste sväljas hela
Hermolepsin Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Humatin	kapsel		56:01	Bör sväljas hela
Hycamtin	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Hydrea	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Hydrokortison APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Hydroxyurea Medac	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Hypochoylin	tablett		56:48	Bör sväljas hela
Ibandronate Bluefish	filmdragerad tablett		55:42	Måste sväljas hela
Ibandronic acid Sandoz	filmdragerad tablett		55:42	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Ignorin	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Imdur	depottablett	120 mg	55:01	Måste sväljas hela
Imdur	depottablett	30 mg 60 mg	56:10	Bör sväljas hela
Imigran Novum	filmdragerad tablett		56:83	Bör sväljas hela
Immunoprin	filmdragerad tablett		56:32	Bör sväljas hela
Imodium	kapsel		56:85	Bör sväljas hela
Imodium	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Imogaze	kapsel, mjuk		56:90	Bör sväljas hela
Imurel	filmdragerad tablett		56:32	Bör sväljas hela
INCIVO	filmdragerad tablett		55:73	Måste sväljas hela
Inderal Retard	depotkapsel, hård		56:29	Bör sväljas hela
Inegy	tablett		55:68	Måste sväljas hela
Inexium	enterotablett		56:18	Bör sväljas hela
Inlyta	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Inspra	filmdragerad tablett		56:77	Bör sväljas hela
Intelence	tablett		56:78	Bör sväljas hela
Invega	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Invirase	filmdragerad tablett		56:61	Bör sväljas hela
Invirase	kapsel, hård		56:09	Bör sväljas hela
Ipren	kapsel, mjuk		55:03	Måste sväljas hela
IRESSA	filmdragerad tablett		56:91	Bör sväljas hela
Isentress	filmdragerad tablett		56:00	Bör sväljas hela
Ismo Retard	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Isodur	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Isoptin Retard	depottablett	120 mg	55:01	Måste sväljas hela
Isoptin Retard	depottablett	180 mg 240 mg	56:10	Bör sväljas hela
Isosorbidmononitrat Astimex, Mylan	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Isotretinoin Orifarm	kapsel, mjuk		55:75	Måste sväljas hela
Itrakonazol Actavis	kapsel, hård		56:09	Bör sväljas hela
Itrakonazol STADA	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Itraconazole Sandoz	kapsel, hård		55:77	Måste sväljas hela
Kaleorid	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Kaletra	kapsel, mjuk		55:03	Måste sväljas hela
Kaletra	filmdragerad tablett		55:05	Måste sväljas hela
Kaptopril APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Karbakolinklorid APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Ketek	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Kivexa	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Klomipramin Mylan	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Kolkicin APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Kortisonacetat APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Kreon 10000	enterokapsel, hård		56:62	Bör sväljas hela
Kreon 25000	enterokapsel, hård		56:63	Bör sväljas hela
Kreon för kinder	granulat		55:40	Måste sväljas hela
Lafunomyl	depottablett		55:01	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Lamictal	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Lamotrigin 1A Farma, Actavis, BMM Pharma, Ebb, Hexal, ratiopharm	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Lampren SGC U12	kapsel		56:01	Bör sväljas hela
Lansoprazol Arrow	enterokapsel, hård		56:62	Bör sväljas hela
Lansoprazol Krka	enterokapsel, hård	15 mg	56:19	Bör sväljas hela
Lansoprazol Krka	enterokapsel, hård	30 mg	56:62	Bör sväljas hela
Lansoprazol Mylan, Pensa	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Lanvis	tablett		56:50	Bör sväljas hela
Lariam	tablett		56:97	Bör sväljas hela
Lasix Retard	depotkapsel, hård		56:29	Bör sväljas hela
Laxoberal	kapsel, mjuk		56:13	Bör sväljas hela
Leflunomide medac	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Lescol	kapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela
Lescol Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Letrozol Accord, Arrow, Mylan, Teva	filmdragerad tablett		56:98	Bör sväljas hela
Letrozol Actavis	filmdragerad tablett		56:61	Bör sväljas hela
Letrozole Bluefish	filmdragerad tablett		56:77	Bör sväljas hela
Letrozole Sandoz	filmdragerad tablett		56:98	Bör sväljas hela
Leukeran	filmdragerad tablett		55:61	Måste sväljas hela
Levocar	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Levodopa/Carbidopa ratiopharm	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Levofloxacin Bluefish, Mylan	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Linella	dragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Lipanthyl	kapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela
Lipitor	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Litarex	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Lithionit	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Lixacol	enterotablett		55:47	Måste sväljas hela
Lodotra	tablett med modifierad frisättning		55:69	Måste sväljas hela
Logimat forte	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Logimax	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Logimax Forte	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Lomir SRO	depotkapsel, hård		55:34	Måste sväljas hela
Lomustine Medac	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Loperamid Mylan	kapsel, hård		56:54	Bör sväljas hela
Losarstad Comp	filmdragerad tablett	50mg/12,5mg	55:31	Måste sväljas hela
Losarstad Comp	filmdragerad tablett	100mg/12,5mg 100mg/25mg	56:67	Bör sväljas hela
Losartan Bluefish	filmdragerad tablett		56:26	Bör sväljas hela
Losec	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Losec	enterotablett		56:55	Bör sväljas hela
Lymecycline Actavis	kapsel, hård		55:18	Måste sväljas hela
Lyrice	kapsel, hård		56:88	Bör sväljas hela
Lysodren	tablett		55:61	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Madopar Depot	depotkapsel, hård		55:34	Måste sväljas hela
Madopark Depot	depotkapsel, hård		55:34	Måste sväljas hela
Mallorol Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Maxalt	tablett		56:08	Bör sväljas hela
Medikinet	kapsel med modifierad frisättning, hård		56:59	Bör sväljas hela
Melleril Retard	tablett		56:10	Bör sväljas hela
Melleril Retard Europharma	tablett		56:10	Bör sväljas hela
Mesavancol	enterodepottablett		55:46	Måste sväljas hela
Metformin Aurobindo, Bluefish, Mylan, Sandoz	filmdragerad tablett		56:92	Bör sväljas hela
Metformin Orifarm	filmdragerad tablett	500 mg 850 mg	56:61	Bör sväljas hela
Metformin Orifarm	filmdragerad tablett	1000 mg	56:42	Bör sväljas hela
Metformin Teva	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Methotrexate Orion	tablett		55:61	Måste sväljas hela
Methotrexate Pfizer, Teva	tablett		56:50	Bör sväljas hela
Metomylan	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Metoprolol Actavis, Orion, ratiopharm	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Metoprolol Sandoz	depottablett		56:25	Bör sväljas hela
Metoprolol GEA Retard	depottablett	50 mg	56:24	Bör sväljas hela
Metoprolol GEA Retard	depottablett	100 mg 200 mg	55:01	Måste sväljas hela
Metotab	tablett		55:61	Måste sväljas hela
Metylskopolamin APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Mezavant	enterodepottablett		55:46	Måste sväljas hela
Mianserin Mylan	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Mimpara	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Minifom	kapsel, mjuk		56:90	Bör sväljas hela
Mirapexin	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Mirtazapin Actavis, Krka, ratiopharm, Teva	filmdragerad tablett	15 mg 30 mg	56:42	Bör sväljas hela
Mirtazapin Actavis, Krka, ratiopharm, STADA, Teva	filmdragerad tablett	45 mg	56:20	Bör sväljas hela
Mirtazapin Alternova, Arrow, Hexal, STADA	filmdragerad tablett		56:92	Bör sväljas hela
Modafinil Mylan	tablett		56:09	Bör sväljas hela
Modiodal	tablett		56:09	Bör sväljas hela
Monoket OD	depotkapsel, hård		55:34	Måste sväljas hela
Mozoc	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Multaq	filmdragerad tablett		55:05	Måste sväljas hela
Mutaflor	kapsel		55:50	Måste sväljas hela
Myclausen	filmdragerad tablett		55:21	Måste sväljas hela
Myclausen	kapsel, hård		55:56	Måste sväljas hela
Mycophenolate mofetil Accord, Arrow, Sandoz	filmdragerad tablett		55:21	Måste sväljas hela
Mycophenolate mofetil Arrow, Sandoz	kapsel, hård		55:56	Måste sväljas hela
Myfenax	filmdragerad tablett		55:21	Måste sväljas hela
Myfenax	kapsel, hård		55:56	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Myfortic	enterotablett		55:13	Måste sväljas hela
Mykofenolatmofetil Actavis, STADA	filmdragerad tablett		55:21	Måste sväljas hela
Mykofenolatmofetil Actavis, STADA	kapsel, hård		55:56	Måste sväljas hela
Mylelan	filmdragerad tablett		55:61	Måste sväljas hela
Naprosyn Entero	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Naramig	filmdragerad tablett		56:77	Bör sväljas hela
Natriumklorid APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Natulan	kapsel		55:12	Måste sväljas hela
Navelbine	kapsel, mjuk		55:32	Måste sväljas hela
Navoban	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Neotigason	kapsel, hård		56:23	Bör sväljas hela
Neurontin	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Neurontin	kapsel, hård		56:72	Bör sväljas hela
Nexavar	filmdragerad tablett		56:76	Bör sväljas hela
Nexiam	enterotablett		56:18	Bör sväljas hela
Nexium	enterotablett		56:18	Bör sväljas hela
Nexium HP	tablett		56:17	Bör sväljas hela
Niferex	enterokapsel, hård		56:84	Bör sväljas hela
Nimotop	filmdragerad tablett		56:92	Bör sväljas hela
Nimvastid	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
Nipaxon	tablett		56:42	Bör sväljas hela
Nixacid	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Nobligan	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Nobligan	tablett		56:51	Bör sväljas hela
Nobligan Retard	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Norflex	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Norfloxacin Sandoz	filmdragerad tablett		56:04	Bör sväljas hela
Norvir	filmdragerad tablett		55:76	Måste sväljas hela
Norvir	kapsel, mjuk		55:74	Måste sväljas hela
Nycolutamid	filmdragerad tablett		56:98	Bör sväljas hela
Olanzapin Actavis, Orion, Sandoz, STADA	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Olanzapin Lilly	dragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Olanzapin Ranbaxy	tablett		56:08	Bör sväljas hela
Olanzapine Accord, Mylan, Teva	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Olanzapine Glenmark	tablett		56:08	Bör sväljas hela
Omacor	kapsel		56:06	Bör sväljas hela
Omecat	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Omeprazol Actavis, Apofri, Mylan, ratiopharm	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Omeprazol Arrow	enterokapsel, hård		56:55	Bör sväljas hela
Omeprazol Bluefish, Evolan, Pensa, Sandoz, STADA, Teva	enterokapsel, hård		56:11	Bör sväljas hela
Omeprazol Alternova	enterotablett		55:03	Måste sväljas hela
Omeprazol BMM Pharma	enterotablett		55:08	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Omestad	enterokapsel, hård		56:19	Bör sväljas hela
Omezolmyl	enterokapsel, hård		56:11	Bör sväljas hela
Omnice	kapsel		56:99	Bör sväljas hela
Ondansetron Teva	filmdragerad tablett	4 mg	55:68	Måste sväljas hela
Ondansetron Teva	filmdragerad tablett	8 mg	56:14	Bör sväljas hela
Onglyza	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Optinate	filmdragerad tablett		55:51	Måste sväljas hela
Optinate Combi	filmdragerad tablett		55:59	Måste sväljas hela
Optinate Septimum	filmdragerad tablett		55:51	Måste sväljas hela
Oracea	kapsel med modifierad frisättning, hård		55:41	Måste sväljas hela
Oralin	filmdragerad tablett		56:14	Bör sväljas hela
Orfadin	kapsel, hård		56:87	Bör sväljas hela
Orfiril	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Orfiril Long	depotgranulat		55:11	Måste sväljas hela
Orfiril Long	depotkapsel, hård		56:66	Bör sväljas hela
Oriptan	filmdragerad tablett		56:02	Bör sväljas hela
Orudis	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Orudis Retard	depotkapsel, hård		56:29	Bör sväljas hela
Osvaren	filmdragerad tablett		56:67	Bör sväljas hela
Oxikodon Acino	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Oxybutynin Mylan	tablett		56:42	Bör sväljas hela
Oxycodone Lannacher, Sandoz, Teva	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Oxycodone ratiopharm, Teva	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
OxyContin	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
OxyNorm	kapsel, hård		56:57	Bör sväljas hela
Palexia Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Palladon	depotkapsel, hård		56:46	Bör sväljas hela
Palladon	kapsel, hård		56:15	Bör sväljas hela
Pantoloc	enterotablett		55:44	Måste sväljas hela
Pantoloc Control	enterotablett		55:44	Måste sväljas hela
Pantoprazol Actavis, Krka, Orifarm, Pensa	enterotablett		55:44	Måste sväljas hela
Pantoprazol Ranbaxy	enterotablett	20 mg	55:08	Måste sväljas hela
Pantoprazol Ranbaxy	enterotablett	40 mg	55:44	Måste sväljas hela
Pantoprazol Ratiopharm, Sandoz, STADA	enterotablett		55:08	Måste sväljas hela
Pantoprazole Bluefish	enterotablett		55:44	Måste sväljas hela
Pariet	enterotablett	10 mg	55:44	Måste sväljas hela
Pariet	enterotablett	20 mg	55:08	Måste sväljas hela
Parlodel	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Paroxetin Actavis	filmdragerad tablett	10 mg	56:64	Bör sväljas hela
Paroxetin Actavis, EQL Pharma, HEXAL, Orion	filmdragerad tablett	20 mg 40 mg	56:67	Bör sväljas hela
Paroxiflex	filmdragerad tablett		56:67	Bör sväljas hela
Pentasa	depottablett		56:07	Bör sväljas hela
Pentasa Sachet	depotgranulat		55:38	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Persantin Depot	depotkapsel, hård		56:99	Bör sväljas hela
Phos-Ex	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Pikazol Forte	kapsel, mjuk		56:06	Bör sväljas hela
Plenadren	tablett med modifierad frisättning		55:60	Måste sväljas hela
Plendil	depottablett		55:27	Måste sväljas hela
Pradaxa	kapsel, hård		55:70	Måste sväljas hela
Pravidel	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Precosa	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Prednisolon APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Premalex	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Priligy	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Prograf	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Prograft	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Prometax	kapsel, hård		56:79	Bör sväljas hela
Propecia	filmdragerad tablett		56:21	Bör sväljas hela
Proscar	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Puri-nethol	tablett		56:50	Bör sväljas hela
Quetiapin Arrow, Orion	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Ramipril Actavis	tablett		56:42	Bör sväljas hela
Ramipril Arrow	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Ramipril Aurobindo, Krka	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Ramipril HEXAL	tablett	1,25 mg	56:14	Bör sväljas hela
Ramipril HEXAL, STADA	tablett	2,5 mg 5 mg 10 mg	56:67	Bör sväljas hela
Ramipril Orifarm	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Ramipril ratiopharm	tablett	2,5 mg 10 mg	56:67	Bör sväljas hela
Ramipril ratiopharm	tablett	5 mg	56:20	Bör sväljas hela
Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, Hexal	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Ranilin	filmdragerad tablett		56:83	Bör sväljas hela
Rapamune	dragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Rebetol	kapsel, hård		55:49	Måste sväljas hela
Reductil	kapsel, hård		55:33	Måste sväljas hela
Relpax	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Remeron	filmdragerad tablett	30 mg	56:42	Bör sväljas hela
Remeron	filmdragerad tablett	45 mg	56:20	Bör sväljas hela
Reminyl	depotkapsel, hård		56:47	Bör sväljas hela
Renagel	filmdragerad tablett		55:28	Måste sväljas hela
Renvela	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Requip Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Retrovir	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Retrovir	kapsel, hård		56:80	Bör sväljas hela
Reumacon	kapsel		55:35	Måste sväljas hela
Revlimid	kapsel, hård		55:15	Måste sväljas hela
Reyataz	kapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela
Rimactan	kapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Rimactan	dragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Rimactazid	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Rimcure	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Rimstar	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Rinexin	depottablett		55:24	Måste sväljas hela
Risedronat Actavis, Jubilant, Orifarm, Sandoz, Stada, Teva	filmdragerad tablett		55:51	Måste sväljas hela
Risedronate Bluefish, Ranbaxy	filmdragerad tablett		55:51	Måste sväljas hela
Ritalin	kapsel med modifierad frisättning, hård		56:43	Bör sväljas hela
Rivastigmin Orifarm, Orion, Stada	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
Rivastigmine Actavis	kapsel, hård		55:74	Måste sväljas hela
Rivastigmine Sandoz	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
Roaccutan	kapsel		56:05	Bör sväljas hela
Rocaltrol	kapsel, mjuk		55:22	Måste sväljas hela
Ropinirol Krka, Sandoz	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Ropinirol Mylan	filmdragerad tablett		56:67	Bör sväljas hela
Ropinirol Stada	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Ropinirole Teva	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Rytmonorm	filmdragerad tablett		56:39	Bör sväljas hela
Sabamin	kapsel, mjuk		56:06	Bör sväljas hela
Salagen	tablett		56:81	Bör sväljas hela
Salazopyrin EN	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Salofalk	enterodepotgranulat		55:06	Måste sväljas hela
Samsca	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Sandimmun Neoral	kapsel, mjuk		55:03	Måste sväljas hela
Saroten	filmdragerad tablett		56:76	Bör sväljas hela
Sebivo	filmdragerad tablett		56:02	Bör sväljas hela
Selen APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
SelokenZOC	depottablett		56:25	Bör sväljas hela
Sendoxan	dragerad tablett		56:01	Bör sväljas hela
Seroquel Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Seroxat	filmdragerad tablett		56:67	Bör sväljas hela
Siduro Retard	depotkapsel, hård		56:29	Bör sväljas hela
Sifrol	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Sinemet Depot	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Sinemet Depot Mite	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Sorbangil	tablett		56:24	Bör sväljas hela
Sortis	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Speridol	filmdragerad tablett		56:12	Bör sväljas hela
Spironolakton APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Sporanox	kapsel, hård		55:75	Måste sväljas hela
Sprycel	filmdragerad tablett		55:61	Måste sväljas hela
Stalevo	filmdragerad tablett		56:26	Bör sväljas hela
Starlix	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Stocrin	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Stocrin	kapsel, hård		56:79	Bör sväljas hela
Strattera	kapsel, hård		56:47	Bör sväljas hela
Sulfasalazin medac	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Sumatriptan Actavis	dragerad tablett		56:97	Bör sväljas hela
Sumatriptan Arrow	tablett		56:61	Bör sväljas hela
Sumatriptan Aurobindo	tablett		56:02	Bör sväljas hela
Sumatriptan Bluefish	tablett		55:31	Måste sväljas hela
Sumatriptan EQL Pharma	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Sumatriptan Mylan, Sandoz	filmdragerad tablett		56:97	Bör sväljas hela
Sumatriptan STADA	tablett		56:26	Bör sväljas hela
Sumatriptan Teva	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Surmontil	kapsel		56:01	Bör sväljas hela
Surmontil	tablett		56:08	Bör sväljas hela
Sutent	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Tacni	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Tacrolimus Accord	kapsel, hård		56:47	Bör sväljas hela
Tacrolimus Sandoz	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Tahor	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Tambocor Retard	depotkapsel, hård		55:04	Måste sväljas hela
Tamiflu	kapsel, hård		56:60	Bör sväljas hela
Targiniq	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Targretin	kapsel, mjuk		55:32	Måste sväljas hela
Tarivid	tablett		56:42	Bör sväljas hela
Tasigna	kapsel, hård		56:94	Bör sväljas hel
Tasmar	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Tavanic	filmdragerad tablett		56:42	Bör sväljas hela
Tegretol Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Telzir	filmdragerad tablett		56:61	Bör sväljas hela
Temodal	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Temomedac	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Temozolomid STADA	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Temozolomide Sandoz, SUN, Teva	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Terbinafin AGP	tablett		56:67	Bör sväljas hela
Tetracyklin Meda	tablett		55:42	Måste sväljas hela
Tetralysal	kapsel, hård		55:18	Måste sväljas hela
Teveten	filmdragerad tablett		56:14	Bör sväljas hela
Tevetenz	filmdragerad tablett		56:14	Bör sväljas hela
Teysuno	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Thalidomide Celegene	kapsel, hård		55:15	Måste sväljas hela
Theo-Dur	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Tiparol	kapsel, hård		56:73	Bör sväljas hela
Tiparol OD	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Tiparol Retard	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Toilax	enterotablett		55:45	Måste sväljas hela
Tolterodin Actavis, Mylan, Pfizer	depotkapsel, hård		55:77	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Tolterodin Sandoz	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Tolterodine Sandoz	depotkapsel, hård		55:37	Måste sväljas hela
Topamac	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Topimax	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Topimax	kapsel, hård		56:02	Bör sväljas hela
Topiramate Actavis, Bluefish, Orion, ratiopharm, Sandoz	filmdragerad tablett		56:20	Bör sväljas hela
Torvast	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Toviaz	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Tradolan Retard	depottablett	100 mg	55:01	Måste sväljas hela
Tradolan Retard	depottablett	150 mg 200 mg	56:10	Bör sväljas hela
Tramadol Actavis	kapsel, hård		56:01	Bör sväljas hela
Tramadol HEXAL	kapsel, hård		56:73	Bör sväljas hela
Tramadol STADA	kapsel, hård		56:03	Bör sväljas hela
Tramadol Retard Actavis	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Tramadol Retard Hexal	depottablett		55:48	Måste sväljas hela
Tramadol Retard Medartuum	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Trevis	kapsel, hård		56:56	Bör sväljas hela
Triatec	tablett	1,25 mg	56:14	Bör sväljas hela
Triatec	tablett	2,5 mg 5 mg	56:67	Bör sväljas hela
Triatec	tablett	10 mg	56:42	Bör sväljas hela
Triatec comp	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Triatec comp mite	tablett		56:20	Bör sväljas hela
Trileptal	filmdragerad tablett		56:14	Bör sväljas hela
Trimonil Retard	depottablett		56:10	Bör sväljas hela
Trizivir	filmdragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Trobalt	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
UFT	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Undestor Testocaps	kapsel, mjuk		56:96	Bör sväljas hela
Urocit-K	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Ursofalk	kapsel		56:58	Bör sväljas hela
Ursofalk	kapsel, hård		56:58	Bör sväljas hela
Ursosan	kapsel, hård		56:58	Bör sväljas hela
Valaciclovir Arrow, Mylan	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Valcyte	filmdragerad tablett		55:23	Måste sväljas hela
Valtrex	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Vancocin	kapsel, hård		55:36	Måste sväljas hela
Vancomycin Xellia	kapsel, hård		55:36	Måste sväljas hela
Vanquin	dragerad tablett		56:35	Bör sväljas hela
Warfarin APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Wellbutrin	tablett med modifierad frisättning		55:60	Måste sväljas hela
Venlafaxin Actavis, EQL Pharma, Hexal, Krka, Mylan, Orifarm, ratiopharm, Sandoz, STADA	depotkapsel, hård		55:04	Måste sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Venlafaxin AGP	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Venlafaxine Bluefish	depotkapsel, hård		55:04	Måste sväljas hela
Vepesid	kapsel, mjuk		55:32	Måste sväljas hela
Vesicare	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Vfend	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela
Vibranord	tablett		56:31	Bör sväljas hela
Victrelis	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
Videx EC	enterokapsel, hård		55:17	Måste sväljas hela
Wilzin	kapsel, hård		56:88	Bör sväljas hela
Vimovo	tablett med modifierad frisättning		55:71	Måste sväljas hela
Viramune	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Viramune	tablett		56:93	Bör sväljas hela
Visacor	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Vivotif	enterokapsel, hård		55:50	Måste sväljas hela
Volibris	filmdragerad tablett		55:31	Måste sväljas hela
Voltaren	enterotablett		55:26	Måste sväljas hela
Voltaren T	dragerad tablett		56:02	Bör sväljas hela
Voltaren T	kapsel, mjuk		55:33	Måste sväljas hela
Votrient	filmdragerad tablett		55:62	Måste sväljas hela
Votubia	tablett		56:83	Bör sväljas hela
Voxra	tablett med modifierad frisättning		55:60	Måste sväljas hela
Vyndaqel	kapsel, mjuk		55:74	Måste sväljas hela
Xagrid	kapsel, hård		55:41	Måste sväljas hela
XALKORI	kapsel, hård		55:75	Måste sväljas hela
Xanor Depot	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Xatral OD	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Xeloda	filmdragerad tablett		55:61	Måste sväljas hela
Xenical	kapsel, hård		56:04	Bör sväljas hela
Yentreve	enterokapsel, hård		55:09	Måste sväljas hela
Zalasta	tablett		56:08	Bör sväljas hela
Zanlan	filmdragerad tablett		56:12	Bör sväljas hela
Zarator	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Zavedos	kapsel, hård		55:12	Måste sväljas hela
Zavesca	kapsel, hård		56:79	Bör sväljas hela
Zelboraf	filmdragerad tablett		55:12	Måste sväljas hela
Zeldox	kapsel, hård		56:40	Bör sväljas hela
Zemplar	kapsel, mjuk		55:03	Måste sväljas hela
Zerit	kapsel, hård		56:28	Bör sväljas hela
Zink 220	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Zink APL	kapsel, hård		56:05	Bör sväljas hela
Zolmitriptan Actavis, Arrow	filmdragerad tablett		55:68	Måste sväljas hela
Zolmitriptan STADA	tablett		55:72	Måste sväljas hela
Zolmitriptan Teva	filmdragerad tablett		55:37	Måste sväljas hela
Zomig	filmdragerad tablett		56:76	Bör sväljas hela
Zomigon	filmdragerad tablett		56:76	Bör sväljas hela

Namn	Beredn.form	Styrka	Anv.kod/ Förklaring	Text
Zonegran	kapsel, hård		56:47	Bör sväljas hela
Zumo	dragerad tablett		56:97	Bör sväljas hela
Zyban	depottablett		55:01	Måste sväljas hela
Zyprexa	dragerad tablett		56:08	Bör sväljas hela
Zytiga	tablett		55:68	Måste sväljas hela
Zyvoxid	filmdragerad tablett		56:09	Bör sväljas hela

Kommentarer till användaranvisning 55

- 55:01 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:02 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eller tuggas eftersom innehållet kan orsaka irritation i mun och svalg. Dessutom är det inte säkert att man får i sig hela dosen om kapseln delas.
- 55:03 Tabletterna har en hinna som skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om tabletterna delas, tuggas eller krossas förstörs hinnan, vilket leder till försämradeffekt av läkemedlet.
- 55:04 Depotkapslarna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kapslarna krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:05 Upptaget av läkemedlet i kroppen, och därmed effekten, blir bättre om tabletten sväljs hel. Tabletterna ska därför inte delas, krossas eller tuggas. Dessutom smakar tabletterna illa.
- 55:06 Läkemedlet ska verka i tarmen. Granulatet består av korn som har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Kornen frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan och läkemedlet verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:07 Innehållet i kapslarna verkar irriterande på slemhinnor. Kapslarna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med innehållet.
- 55:08 Enterotabletterna har en hinna som skyddar läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Tabletterna löses därför upp först i tarmen. Tabletterna ska sväljas hela för att ge så bra effekt som möjligt och för att minska risken för biverkningar från magen. Tabletterna får inte krossas eller tuggas.
- 55:09 Enterokapslarna innehåller korn, som har en hinna som skyddar läkemedlet mot att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämradeffekt av läkemedlet. Det är inte undersökt om kornen kan tömmas ut ur kapseln och sväljas.
- 55:1 Tabletterna har en skyddande hinna för att förhindra att det verksamma ämnet, som är mycket aktivt, sprids till omgivningen. Om tabletterna delas finns dessutom risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 55:11 Depotgranulatet består av korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:12 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Om kapslarna delas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon.
- 55:13 Det verksamma ämnet är vävnadsretande och tabletterna har därför en hinna som gör att de löses upp först i tarmen. Om tabletterna krossas finns risk för att innehållet inandas eller kommer i kontakt med huden. Man bör inte hantera trasiga tabletter utan handskar.
- 55:14 Enterogranulatet består av korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan vilket leder till försämradeffekt av läkemedlet. Granulatet kan blandas med vätska eller mat, varefter intaget ska ske omedelbart. Det är då viktigt att kornen inte tuggas eller krossas.
- 55:15 Kapslarna ska inte öppnas, krossas eller tuggas. Läkemedlet kan vara fosterskadande och bör inte spridas i omgivningen.
- 55:16 Innehållet i kapslarna är mycket fukt känsligt och sväller om det utsätts för fukt. Kapslarna ska därför inte öppnas.
- 55:17 Enterokapselns hölje löses upp först i tarmen och skyddar därmed läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kapslarna öppnas eller tuggas försämrades effekten av läkemedlet.
- 55:18 Innehållet i kapslarna verkar irriterande på slemhinnor. Kapslarna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med innehållet. Det är heller inte känt hur läkemedlets effekt påverkas om kapslarna öppnas.
- 55:19 Kapslarna ska inte tuggas eller delas. Läkemedlet ska verka i tarmen och kapselhöljet är därför utformat så kapseln passerar magsäcken utan att lösas upp. Dessutom kan pepparmintoljan orsaka irritation i munnen och matstrupen om kapslarna tuggas eller delas.
- 55:2 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas verkar de under kortare tid än förväntat.
- 55:20 Tabletterna består av två lager. Innerst finns en kärna med ett antiinflammatoriskt ämne omgivet av en hinna som skyddar tabletterna från att lösas upp i magsäcken. Därmed frisätts läkemedlet först i tarmen vilket minskar risken för biverkningar från magen. Ytterst på

tablettorna finns ett ämne som frisätts i magsäcken och som skyddar magens slemhinna. Om tablettorna delas, krossas eller tuggas ökar risken för magbesvär.

- 55:21 Innehållet i tablettorna är vävnadsretande. Om tablettorna krossas finns risk för att innehållet inandas eller kommer i direkt kontakt med hud eller slemhinnor. Man bör inte hantera trasiga tabletter utan handskar.
- 55:22 Kapslarna ska inte öppnas eller tuggas, dels för att man ska undvika att få innehållet på huden och dels för att innehållet är ljus- och syrekänsligt.
- 55:23 Tablettorna har en hinna som förhindrar att läkemedlet andas in eller kommer i kontakt med huden. Läkemedlet är fosterskadande och bör inte spridas i omgivningen. Tablettorna ska därför inte delas. Trasiga tabletter ska inte vidröras.
- 55:24 Depottablettorna ger både snabb och långvarig effekt. De består av två lager, ett som snabbt löses upp och frisätter läkemedel och ett som frisätter läkemedel successivt under längre tid. Tablettorna ger på så sätt både en snabb och jämn effekt dygnet runt samt minskad risk för biverkningar. Om tablettorna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:25 Depottablettorna ger både snabb och långvarig effekt. De består av två lager, ett som snabbt löses upp i magen och frisätter läkemedel och ett som löses upp först i tarmen. Effekten av läkemedlet från det inre lagret kommer därför först efter 4-6 timmar. Om tablettorna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:26 Innehållet i tablettorna verkar irriterande på magens slemhinnor. Tablettorna har därför en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Därmed frisätts innehållet först i tarmen vilket minskar risken för biverkningar från magen. Om tablettorna krossas eller tuggas förstörs den skyddande hinnan.
- 55:27 Depottablettorna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då ett jämnt upptag av läkemedel i kroppen och minskad risk för biverkningar. Om tablettorna delas, krossas eller tuggas blir upptaget snabbt och koncentrationen av läkemedel i kroppen hög någon timme efter intag, vilket ökar risken för biverkningar.
- 55:28 Tablettorna ska inte tuggas.
- 55:29 Enterotablettorna har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Tablettorna ska sväljas hela för att inte hinnan ska förstöras. Tablettorna får inte krossas eller tuggas.
- 55:3 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eftersom det då är osäkert om man får i sig hela dosen.
- 55:30 Enterogranulatet består av korn som har en hinna för att dölja saltsmaken, eftersom barnet kan kväljas av kraftig salt smak. Saltsmaken kommer fram om granulatet hålls i munnen mer än ca 20 sekunder. Granulatet ska omedelbart efter intag sköljas ned med vatten eller annan dryck, och ska inte tuggas eller krossas.
- 55:31 Tablettorna är avsedda att sväljas hela. De får inte krossas eller tuggas.
- 55:32 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Innehållet i kapslarna är flytande och om kapslarna delas kan det finnas risk för spill av innehållet, som inte ska komma i kontakt med hud och ögon.
- 55:33 Kapslarna ska sväljas hela för att effekten ska bli så bra som möjligt. Kapslarna ska inte delas eller tuggas.
- 55:34 Depotkapslarna innehåller små korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:35 Kapslarna är omgivna av ett skyddande hölje för att de inte ska lösas upp förrän de nått tarmen.
- 55:36 Innehållet i kapslarna verkar irriterande på slemhinnor. Kapslarna ska sväljas hela för att minska risken för biverkningar från magen.
- 55:37 Tablettorna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas.
- 55:38 Depotgranulatet består av korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel genom hela magtarmkanalen. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Innehållet i dospåsen töms på tungan och sköljs ner med vatten eller apelsinjuice.
- 55:39 Tablettorna är utformade så att det blodtryckssänkande ämnet snabbt frisätts i magsäcken medan kalium frisätts successivt under lång tid. Därmed minskar risken för biverkningar från magen orsakade av kalium. Om tablettorna krossas eller tuggas ökar risken för biverkningar.
- 55:40 Kornen har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet.
- 55:41 Det är inte undersökt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna ska sväljas hela.

- 55:42 Innehållet i tableterna verkar irriterande på slemhinnor. Tableterna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med innehållet. Tableterna ska inte delas, krossas, tuggas eller sugas på.
- 55:43 Depottableterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Kroppen kan då lättare tillgodogöra sig järnet och risken för biverkningar från mage och tarm minskar. Om tableterna delas, krossas eller tuggas ökar risken för biverkningar och effekten försämras.
- 55:44 Enterotableterna har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Tableterna ska lösas upp i tarmen för att ge så bra effekt som möjligt. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan.
- 55:45 Enterotableterna har en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Därmed frisätts läkemedlet först i tarmen vilket minskar risken för biverkningar från magen. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan.
- 55:46 Läkemedlet ska verka i tarmen. Tableterna har därför en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Tableterna är dessutom utformade så att läkemedlet frisätts successivt under lång tid. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan vilket leder till försämrade effekt och dessutom förstörs den förlängda effekten.
- 55:47 Läkemedlet ska verka i tarmen. Tableterna har därför en hinna som förhindrar att de löses upp i magsäcken. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan vilket leder till försämrade effekt.
- 55:48 Depottableterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om tableterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. OBS! Trots att depottableterna har en skåra får de alltså inte delas.
- 55:49 Kapslarna ska inte öppnas för att förhindra att innehållet andas in eller kommer i kontakt med huden. Läkemedlet kan vara fosterskadande och bör inte spridas i omgivningen. Trasiga kapslar ska inte vidröras. Om pulver från kapslarna kommer i kontakt med huden tvättas noga med tvål och vatten. Om pulver från kapslarna kommer i kontakt med ögat sköljs noga med vatten.
- 55:50 Läkemedlet ska verka i tarmen. Kapselhöljet är därför utformat så att det inte löses upp i magsäcken. Om kapslarna öppnas, krossas eller tuggas försämras effekten av läkemedlet.
- 55:51 Tableterna har en hinna som skyddar matstrupen från kontakt med läkemedlet, som verkar irriterande på slemhinnor. Man ska inte tugga eller suga på tableterna eftersom det då finns risk för irritation i munhåla och svalg.
- 55:52 Enterokapslarna innehåller korn, som har en hinna som skyddar läkemedlet mot att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekt av läkemedlet.
- 55:55 Tableterna ger både snabb och långvarig effekt. De består av två lager, ett som snabbt löses upp och frisätter läkemedel och ett som frisätter läkemedel successivt under längre tid. Tableterna ger på så sätt både en snabb och jämn effekt dygnet runt samt minskad risk för biverkningar. Om tableterna delas, krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 55:56 Innehållet i kapslarna är vävnadsretande. Om kapslarna öppnas eller krossas finns risk för att ämnet inandas eller kommer i kontakt med hud eller slemhinnor. Man bör inte hantera trasiga kapslar utan handskar.
- 55:59 Risedronattabletten (ljusorange tablett) har en hinna för att skydda matstrupen från kontakt med läkemedlet, som verkar irriterande på slemhinnor. Man ska inte tugga eller suga på tableterna eftersom det då finns risk för irritation i munhåla och svalg.
- 55:60 Tableterna är utformade så att läkemedlet frisätts successivt under lång tid. Tableterna ska därför inte krossas eller tuggas.
- 55:61 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Om tableterna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon.
- 55:62 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Om tableterna delas eller krossas kan det finnas risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer utsätts för läkemedlet t.ex. genom inandning. Det kan också påverka upptaget i kroppen och öka risken för biverkningar.
- 55:67 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel ska sväljas hela. Om kapslarna delas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning.
- 55:68 Tableterna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas eller krossas.
- 55:69 Tableterna har ett yttre lager (dragering) som gör att effekten fördröjs. Om drageringen skadas fungerar inte läkemedlet på avsett sätt.
- 55:70 Kapslarna får inte öppnas, delas eller tuggas, eftersom effekten då kan bli för stark.
- 55:71 Tableterna består av två lager. Innerst finns en kärna med ett antiinflammatoriskt ämne omgivet av en hinna som skyddar tableterna från att lösas upp i magsäcken. Därmed frisätts läkemedlet först i tarmen vilket minskar risken för biverkningar från magen. Ytterst på

tabletterna finns ett ämne som frisätts i magsäcken och som minskar mängden magsyra. Om tabletterna delas, krossas eller tuggas ökar risken för magbesvär.

- 55:72 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. De får inte tuggas.
- 55:73 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas, tuggas eller lösas upp.
- 55:74 Kapslarna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas eller krossas.
- 55:75 Kapslarna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas, krossas, tuggas eller lösas upp.
- 55:76 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. De får inte delas, tuggas eller krossas.
- 55:77 Kapslarna är avsedda att sväljas hela. De får inte tuggas.

Kommentarer till användaranvisning 56

- 56:0 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.
- 56:00 Tabletterna bör inte delas, tuggas eller krossas. Anledningen är dels att undvika den bittra smaken och dels för att effekten ska bli så bra som möjligt.
- 56:01 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:02 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet strös över t.ex. filmjolk, yoghurt eller äppelmos. Denna blandning av föda och granulat skall sväljas genast utan att tuggas. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:03 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med något livsmedel som döljer smaken. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:04 Tabletterna bör inte delas, tuggas eller krossas eftersom det kan påverka läkemedlets upptag i kroppen.
- 56:05 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:06 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran eller röras ut i vatten, men får inte krossas eller tuggas eftersom de då verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 56:07 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Kapslarna innehåller även en tablett innehållande acetylsalicylsyra. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten eller blandas med en liten mängd kallt vatten eller flytande föda. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:08 Tabletterna är speciellt utformade för att ge något långsammare frisättning av det verksamma ämnet för att minska risken för blodtrycksfall. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran men får inte krossas eller tuggas eftersom deras speciella utformning då förstörs.
- 56:09 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna tuggas.
- 56:1 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om tabletterna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon. Om tabletterna måste krossas är det mycket viktigt att den som gör detta känner till hur läkemedlet ska hanteras på ett säkert sätt. Skyddshandskar och ögonskydd rekommenderas.
- 56:10 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas men får inte krossas eller tuggas eftersom de då verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 56:11 Kapslarna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med lite sur vätska t.ex. fruktjuice eller yoghurt och därefter intas snarast, dock senast inom 20-30 minuter. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:12 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Tabletterna har därför en hinna som döljer smaken. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas.
- 56:13 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eftersom det då är osäkert om man får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna tuggas.
- 56:14 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. De får inte krossas eller tuggas. Vid sväljsvårigheter kan de delas i skåran. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Observera att en halv tablett inte motsvarar halv dos.
- 56:15 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med ett halvt glas vatten eller strös över mat, t.ex. filmjolk, gröt eller glass.
- 56:16 Tabletterna bör inte tuggas, delas, krossas eller sugas på eftersom det kan ge en övergående brännande känsla i mun och svalg.
- 56:17 Nexium-tabletterna bör sväljas hela. De innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om tabletterna krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrad effekt av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna röras ut i ett halvt glas vatten (ej kolsyrat). Blandningen dricks inom 30 minuter följt av vatten för att skölja ner alla korn.

- 56:18 Tableterna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Vid sväljsvårigheter kan tableterna röras ut i ett halvt glas vatten (ej kolsyrat). Blandningen dricks inom 30 minuter. Skölj glaset med ytterligare vatten som sedan dricks upp för att skölja ner alla korn. Om tableterna krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekt av läkemedlet.
- 56:19 Kapslarna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekt av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och kornen sväljas med vätska. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:2 Tableterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Det är inte heller undersökt hur effekten av läkemedlet påverkas om tableterna delas eller krossas.
- 56:20 Tableterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa.
- 56:21 Tableterna har en hinna för att förhindra att det verksamma ämnet inandas eller kommer i kontakt med huden. Krossade eller delade tabletter ska inte hanteras av kvinnor som är eller kan bli gravida. Det verksamma ämnet kan hämma utvecklingen av ett manligt fosters yttre könsorgan.
- 56:22 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas att de sväljs hela. Om detta inte är möjligt kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite vatten eller mat. Det ska därefter intas så fort som möjligt. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:23 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan kapseln öppnas och innehållet omedelbart sväljas med vätska.
- 56:24 Tableterna ska sväljas hela eller delade (har brytskåra). Om tableterna tuggas eller krossas kan de ge för kraftig effekt med ökad risk för biverkningar.
- 56:25 Depottabletterna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tableterna delas i skåran men får inte krossas eller tuggas eftersom de då verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid behov går det även att slamma upp tableterna i lite vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen och att inte tugga sönder kornen.
- 56:26 Vid sväljsvårigheter kan tableterna delas eller krossas. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:27 Tableterna bör sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med det verksamma ämnet, som har en irriterande effekt på slemhinnor. Om tableterna krossas eller tuggas finns risk för irritation i matstrupen. Vid sväljsvårigheter kan tableterna delas i skåran men delarna ska sväljas hela vid samma doseringstillfälle.
- 56:28 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite mat. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:29 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:3 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna är mycket hårda och svåra att skära sönder. Om kapslarna delas är det osäkert om man får i sig hela dosen. Dessutom smakar innehållet i kapslarna illa.
- 56:30 Tableterna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med det verksamma ämnet, som har en irriterande effekt på slemhinnor. Om tableterna krossas eller tuggas så att de små kornen i tableterna går sönder finns risk irritation i matstrupen. Vid sväljsvårigheter kan tableterna delas i skåran och delarna sväljas hela. Tableterna kan även lösas i vatten. Man måste då vara noga med att svälja alla korn.
- 56:31 Tableterna ska sväljas hela för att skydda matstrupen från kontakt med det verksamma ämnet, som har en irriterande effekt på slemhinnor. Om tableterna krossas eller tuggas så att de små kornen i tableterna går sönder finns risk för irritation i matstrupen. Vid sväljsvårigheter kan tableterna lösas i vatten. Man måste då vara noga med att svälja alla korn.
- 56:32 Det verksamma ämnet är vävnadsretande. Om det är nödvändigt att dela eller krossa tableterna bör man förhindra inandning och hudkontakt samt tvätta händerna efteråt.
- 56:33 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite tomat- eller apelsinjuice. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:34 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet är starkt färgande. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med riklig mängd vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:35 Tableterna kan delas eller krossas men det är inget som rekommenderas eftersom innehållet kan missfärga tänder och munhåla.
- 56:36 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Det finns

en möjlighet att öppna kapseln och ta kornen tillsammans med vatten men det är ingenting som rekommenderas eftersom kapseln innehåller många små lätta korn som lätt sprätter iväg.

- 56:37 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om kapslarna delas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite mat. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Pulvret är mycket lätt och är därför svårt att blanda med vätska eftersom det lägger sig på ytan. Om kapslarna delas är det viktigt att den som gör detta känner till hur läkemedlet ska hanteras på ett säkert sätt. Till exempel kan handskar användas vid delning av kapslarna.
- 56:38 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas att de sväljs hela. Om detta inte är möjligt bör det gå att öppna dem och svälja innehållet med vatten. En kapsel innehåller både en tablett och granulat. Man ska vara noga med att få i sig allt innehåll i kapseln.
- 56:39 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa och verkar bedövande, vilket kan upplevas obehagligt om tabletterna tuggas.
- 56:4 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna sväljs hela. Teoretiskt går det dock att öppna kapseln och t.ex. strö innehållet över maten.
- 56:40 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas att de sväljs hela. Om detta inte är möjligt bör det gå att öppna dem och svälja innehållet med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Pulvret i kapseln är olösligt i vatten och utan smak. Eventuell delning av kapseln bör diskuteras med behandlande läkare.
- 56:41 Det verksamma ämnet (kaliumklorid) kan irritera slemhinnorna i mage och tarm och smakar dessutom illa. För att skydda slemhinnorna och dölja smaken är varje enskild kaliumklorid-kristall omgiven av ett skyddande lager. För att inte det skyddande lagret ska förstöras bör tabletterna sväljas hela. De kan dock slammas upp i vatten eller delas i skåran, men får ej krossas till pulver eller tuggas.
- 56:42 Tabletterna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas.
- 56:43 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet strös på lite mat, t.ex. fruktmos. Maten får inte vara varm eftersom effekten då kan påverkas. Hela blandningen ska intas direkt. Innehållet i kapslarna får inte krossas, tuggas eller delas upp i flera doser.
- 56:44 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite mat eller dryck. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:45 Depotgranulaten bör sväljas hela tillsammans med vätska eller blandas ned i föda (t.ex. yoghurt, gröt). De får inte tuggas eftersom det då finns risk för att de verkar för kraftigt och kortare tid än förväntat.
- 56:46 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med t.ex. vatten, fil eller yoghurt. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:47 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna sväljs hela. I de fall kunden absolut inte kan svälja kapslarna hela måste frågan diskuteras med läkare och tillverkaren.
- 56:48 Det verksamma ämnet sönderdelas snabbt och då frigörs saltsyra. Om man löser upp, tuggar eller suger på tablettens bildade saltsyran skada tänderna.
- 56:49 Tabletterna bör sväljas hela för att ge så bra effekt som möjligt. Tabletterna har en hinna som gör att de snabbt och fullständigt löses upp i magen. Om tabletterna krossas eller tuggas kan läkemedlets effekt påverkas. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna delas i skåran och delarna sväljas hela.
- 56:5 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Kapslarna är gjutna och svåra att dela. Om man försöker dela dem finns risk för spill och det är då inte säkert att man får i sig hela dosen.
- 56:50 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om tabletterna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Många läkemedel av denna typ är även irriterande på hud och ögon. Tabletterna kan dock delas och det är då viktigt att den som gör detta känner till hur läkemedlet ska hanteras på ett säkert sätt. Till exempel ska händerna tvättas omedelbart efter hantering av delade tabletter. Handskar kan användas vid delning av tabletter.
- 56:51 Tabletterna är avsedda att sväljas hela. Vid sväljsvårigheter kan de lösas i cirka ett halvt glas vatten. Det blir en grumlig lösning. OBS! Trots att tabletterna har en skåra får de inte delas om syftet är att ta halv dos eftersom man inte vet om det verksamma ämnet är jämnt fördelat i tablettens.
- 56:52 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om tabletterna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom

inandning. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna lösas i mineralvatten eller äppeljuice. Lämplig mängd vätska är 50 ml till en 100 mg-tablett och 200 ml till en 400 mg-tablett. Blandningen rörs om med sked tills tablettorna har lösts fullständigt och dricks därefter omedelbart.

- 56:53 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan man öppna kapseln och tömma innehållet i munnen.
- 56:54 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Dessutom smakar det verksamma ämnet illa.
- 56:55 Tablettorna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om tablettens krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekter av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan tablettens delas (har dock ingen skåra) och blandas ut i vatten eller sur vätska (juice). Blandningen dricks inom 30 minuter följt av vatten för att skölja ner alla kornen.
- 56:56 Kapslarna bör sväljas hela för att effekten ska bli så bra som möjligt. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten utan att tuggas.
- 56:57 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet kan läggas på en sked med fil eller kräm innan de sväljas. Därefter bör man dricka vatten för att vara säker på att alla granula sväljs ned. Man ska inte tömma ur kapslarna i ett glas vatten eftersom granula är tunga och faller till botten. Det finns då en risk att man inte får i sig hela dosen.
- 56:58 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med riklig mängd vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:59 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet strös på lite mat, t.ex. fruktmos. Hela blandningen ska intas direkt. Det är bra om man dricker lite vätska efteråt, till exempel vatten. Innehållet i kapslarna får inte krossas, tuggas eller delas upp i flera doser.
- 56:60 Innehållet i kapslarna är flytande. Kapslarna ska inte delas eftersom det då är osäkert om man får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter går det att tugga kapslarna men innehållet smakar illa.
- 56:61 Kapslarna får inte krossas eller tuggas. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i en liten skål med max en tesked sött livsmedel för att dölja den bittra smaken. Exempel på livsmedel är chokladsås, dessertsås, äppelmos eller yoghurt. Blandningen måste sväljas genast efter beredning. Skålen sköljs med lite vatten som dricks upp för att man ska få i sig hela dosen.
- 56:62 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna delas eller krossas. Det rekommenderas därför att tablettorna sväljs hela men om detta inte är möjligt bör det gå att dela eller krossa dem. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:63 Kapslarna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekter av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med vätska eller föda t.ex. vatten, äppel- eller tomatjuice, eller strös över en klick mjuk mat som äppelmos eller yoghurt som inte behöver tuggas. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:64 Kapslarna innehåller korn som har en hinna för att skydda läkemedlet från att förstöras av den sura miljön i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas förstörs hinnan, vilket leder till försämrade effekter av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas med sur vätska (juice) eller föda som inte behöver tuggas t.ex. filmjök eller yoghurt. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:65 Vid sväljsvårigheter kan de delas i skåran. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Observera att en halv tablett inte motsvarar halv dos.
- 56:66 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med riklig mängd vatten. Pulvret kan även röras ut i till exempel sylt eller yoghurt för att dölja smaken. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:67 Depotkapslarna innehåller korn som successivt frisätter mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i flytande föda eller dryck. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:68 Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas i skåran. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:69 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i en sked vatten eller saft. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:70 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet är starkt färgande. Det är inte heller undersökt hur läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna eventuellt öppnas och innehållet slamas upp i lite vatten.
- 56:71 Depottablettorna frisätter successivt mindre mängder läkemedel genom hela magtarmkanalen. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas i skåran men får inte krossas eller tuggas eftersom

de då verkar de för kraftigt och kortare tid än förväntat. Vid behov går det även att slamma upp tablettorna i ca 3 matskedar vatten och dricka omedelbart. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen och att inte tugga sönder kornen.

- 56:70 Kapslarna ska verka i tarmen. Kornen i kapslarna har därför en hinna som förhindrar att de löses upp i magen. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i till exempel lite vatten. Kornen får dock inte tuggas eftersom man då förstör den skyddande hinnan. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:71 Depotkapslarna ska verka i tarmen och innehåller korn som har en hinna för att förhindra att kornen löses upp i magsäcken. Dessutom frisätter kornen mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Om kornen krossas eller tuggas försämras effekten av läkemedlet. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas blandat med en matsked äppelmos. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:72 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten eller blandas med något livsmedel som döljer smaken. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Innehållet i kapseln måste intas direkt efter att kapseln öppnats.
- 56:73 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen. Innehållet i kapseln måste intas direkt efter att kapseln öppnats.
- 56:74 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan man i undantagsfall öppna kapseln och blanda innehållet med t.ex. filmjolk, yoghurt, sylt eller juice. Det är då viktigt att skölja munnen med vatten efteråt för att inte den normala bakteriefloran i munnen ska påverkas av läkemedlet.
- 56:75 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite juice eller vatten. Blandningen måste intas omedelbart. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:76 Tablettorna bör inte delas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:77 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna delas eller krossas. Tillverkarens rekommendation är därför att tablettorna ska sväljas hela. Om man har mycket svårt att svälja och tablettorna delas ska man vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:78 Tablettorna ska inte tuggas. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna läggas i ett glas vatten. Blandningen rörs om ordentligt tills vattnet får ett mjölkigt utseende och dricks sedan omedelbart. Glaset sköljs med vatten, som sedan dricks upp. Detta upprepas flera gånger för att säkerställa att man får i sig hela dosen.
- 56:79 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:8 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna delas eller krossas. Dessutom finns risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:80 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Det är inte undersökt hur läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Om kapslarna öppnas finns dessutom risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:81 Tablettorna har en hinna för att skydda det verksamma ämnet från att förstöras av luft.
- 56:82 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det då finns risk för att man inte får i sig hela dosen. Vid sväljsvårigheter kan man i undantagsfall öppna kapseln och svälja innehållet med vatten eller blandat med lite filmjolk/yoghurt på en sked. Kapslarna kan även tuggas sönder.
- 56:83 Tablettorna bör sväljas hela. Vid sväljsvårigheter kan läkemedlet lösas i vatten före intag. Se mer information i bipacksedel.
- 56:84 Kapslarna innehåller korn som har en hinna som förhindrar att kornen löses upp i magsäcken. Om kornen krossas eller tuggas skadas hinnan och risken för biverkningar från magen ökar. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och kornen sväljas med riklig mängd vätska. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:85 Kapslarna bör sväljas hela eftersom innehållet smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten eller blandas med lite filmjolk/yoghurt på en sked. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:86 Granulatet består av korn som är sockerdragerade för att kostfibrerna i läkemedlet ska börja svälla först i magsäcken och därmed ge bästa möjliga effekt. Om kornen tuggas skadas sockerdrageringen.
- 56:87 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite vatten eller flytande föda. Blandningen måste intas omedelbart. Man ska vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:88 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet blandas i lite vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:89 Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet strös på mat (t.ex. mjölk, potatis) eller blandas i modersmjölkersättning. Det ska inte blandas med sura drycker t.ex. apelsinjuice.
- 56:9 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna öppnas. Därför rekommenderas att de sväljs hela. Om detta inte är möjligt bör det gå att öppna dem och svälja innehållet med vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.

- 56:90 Innehållet i kapslarna är flytande. Det är inte undersökt hur effekten av läkemedlet påverkas om kapslarna delas, krossas eller tuggas. Tillverkarens rekommendation är därför att kapslarna bör sväljas hela.
- 56:91 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om tablettorna delas eller krossas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Vid sväljsvårigheter kan man lägga tablettan hel i ett glas kranvatten, röra om tills den har lösts upp (kan ta 20 minuter) och därefter genast dricka upp lösningen. Glaset rengörs från läkemedelsrester genom att man åter fyller det till hälften med vatten, sköljer runt och dricker.
- 56:92 Tablettorna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas eller krossas. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:93 Det är inte känt hur effekten av läkemedlet påverkas om tablettorna tuggas eller krossas. Det rekommenderas därför att tablettorna sväljs hela. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna delas i skåran.
- 56:94 Generellt gäller, av säkerhetsskäl, att denna typ av läkemedel bör sväljas hela. Om kapslarna delas kan det finnas en viss risk för att det verksamma ämnet sprids i omgivningen, så att även andra personer kan utsättas för läkemedlet t.ex. genom inandning. Vid sväljsvårigheter kan kapseln öppnas och innehållet blandas med en tesked mosat äpple. Det ska därefter intagas direkt. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:95 Kapslarna bör inte öppnas eftersom det kan påverka upptaget av läkemedlet i kroppen. Det finns också risk för att man inte får i sig hela dosen om kapslarna öppnas.
- 56:96 Innehållet i kapslarna är flytande. Om kapslarna delas är det osäkert om man får i sig hela dosen.
- 56:97 Tablettorna bör sväljas hela eftersom de smakar illa. Vid sväljsvårigheter kan tablettan delas eller krossas och blandas med lite vatten. Man ska då vara noga med att få i sig hela dosen.
- 56:98 Tablettorna har en skyddande hinna för att förhindra att det verksamma ämnet sprids till omgivningen. Tillverkarens rekommendation är därför att de sväljs hela. Om tablettorna delas finns dessutom risk för att man inte får i sig hela dosen.
- 56:99 Depotkapslarna frisätter successivt mindre mängder läkemedel under lång tid. Man får då en jämn och långvarig effekt och minskad risk för biverkningar. Vid sväljsvårigheter kan kapslarna öppnas och innehållet sväljas med vatten eller blandas med en liten mängd kall vätska och därefter omedelbart sväljas. Innehållet i kapslarna får inte tuggas eller krossas.

Copyright och ansvarsfriskrivning

Användning av material samt upphovsrätt

Denna förteckning ägs av Apoteket AB ("Apoteket"). Du får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut förteckningen från webbplatsen, för personligt icke-kommersiellt bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Förteckningen får inte användas på annat sätt än det avsedda (enligt ovan) utan att Apoteket först har medgivit detta skriftligen.

Ansvarsfriskrivning

Förteckningen "Sväljes hela" tillhandahålls i befintligt skick. Apoteket ger inga garantier avseende materialet. Apoteket ansvarar inte för någon skada som uppkommer till följd av att någon har förlitat sig på tillhandahållen information. Apoteket garanterar inte heller att användning av förteckningen inte kan innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part.

Tillämplig lag

Denna ansvarsfriskrivning och förteckning skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med denna ansvarsfriskrivning skall, om de inte löses i godo, avgöras av svensk domstol.